

AGITA® 10WG

VODODISPERZIONE GRANULE



OZNAKA RIZIKA:

R 50/53 – Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini



OPASNO PO ŽIVOTNU SREDINU

OZNAKA BEZBEDNOSTI:

S 2 – Čuvati van domašaja dece

S 46 – Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu

S 60 – Ova hemikalija i njena ambalaža moraju se odložiti kao opasan otpad

S61 – Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu; pridržavati se posebnih uputstava/bezbednosnog lista

SASTAV:	- tiametoksam (CAS br. 153719-23-4)10,0 %
	- inertni nosačdo 100 %

AGITA® 10WG je insekticid za profesionalnu upotrebu za suzbijanje muva u objektima gde se domaće životinje drže i čuvaju.

NAČIN DELOVANJA: Agita® 10WG je insekticid koji sadrži aktivnu supstancu tiametoksam iz grupe neonicotinoida, koji inhibira acetilholin receptore B kod muva.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČIN PRIMENE INSEKTICIDA:

Za premazivanje: 100g preparata rastvoriti u 80ml mlake vode, ili 400g preparata rastvoriti u 320ml mlake vode. Prvo razređenje je dovoljno za površinu objekta od 40m² ili površinu zidova/plafona od 80-120m²; drugo razređenje je dovoljno za površinu objekta od 160m² ili površinu zidova/plafona od 320-480m². Na svakih 100m² površine premaže se minimum 20 „spotova“ površine 10cmx30cm na mestima gde se muve skupljaju (topla i osunčana mesta, ramovi od prozora, okviri od vrata..itd).

Za prskanje: 100g preparata rastvoriti sa 0,8l mlake vode, ili 400g preparata rastvoriti u 3,2l mlake vode. Prvo razređenje je dovoljno za površinu objekta od 20m² ili površinu zidova/plafona od 40-60m²; drugo razređenje je dovoljno za površinu objekta od 80m² ili površinu zidova/plafona od 160-240m². Oko 30% površine treba tretirati direktno na mestima gde se muve skupljaju (topla i osunčana mesta, ramovi od prozora, okviri od vrata..itd).

Za pripremu radnog rastvora prvo napuniti posudu/prskalicu mlakom vodom, a zatim postepeno dodavati AGITU® 10WG. Mešati rastvor sve dok se ne napravi suspenzija. Ukoliko se prskanje prekine na više od 30 minuta, obavezno ponoviti mučkanje posude/prskalice sa radnim rastvorom. Za najbolje rezultate preporučuje se upotreba radnog rastvora odmah nakon pripreme.

Ako se upotrebljava prema uputstvu, efikasnost radnog rastvora traje 6 nedelja (42 dana).

MERE PREDOSTROŽNOSTI:

- Insekticid čuvati van domašaja dece.
- Za vreme primene proizvoda treba nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Zabranjeno je jesti, piti i pušiti.
- Nakon završetka rada treba oprati lice i ruke.
- Sprečiti dodir proizvoda sa hranom i hranom za životinje.
- Proizvod skladištiti u suvim, tamnim, dobro provetrenim prostorijama koje se zaključavaju. Čuvati u originalnoj ambalaži na temperaturi od -10⁰C do +30⁰C, zaštićeno od svetlosti i vlage.
- Na praznu ambalažu primeniti odredbe Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. glasnik br. 36/09, 88/10), a sa neutrošenom količinom preparata postupiti u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Sl. glasnik br. 36/09, 88/10).

UPUTSTVO ZA PRVU POMOĆ:

Nema poznatog specifičnog antidota i ukoliko tokom rada dođe do malaksalosti, odmah se prekida sa radom. Ako simptomi ne prestanu pozvati Nacionalni centar za kontrolu trovanja na telefone: **011 3608 440** i **3608 234**.

U slučaju trovanja životinja, obratiti se najbližoj veterinarskoj stanici i ako je moguće pokazati ovu etiketu.

REŠENJE za stavljanje u promet izdato od strane Agencije za hemikalije br. 532-01-161/2010-03

PAKOVANJE: 100g, 400g

PROIZVOĐAČ:

NOVARTIS VETERINA d.o.o. Slovenija

UVOZNIK za Srbiju:

EKOSAN d.o.o. Beograd
www.ekosan.co.rs

ROK UPOTREBE: 5 godina od datuma proizvodnje.

DATUM PROIZVODNJE: utisnut na ambalaži